

[19. 5. 2021](#)

**Na podlagi ocene epizootiološke situacije je Državno središče za nadzor bolezni sprejelo sklep, da se ukinejo ukrepi, uvedeni zaradi pojavov aviarne influence pri prostoživečih pticah. Sklep o ukinitvi ukrepov je objavljen v Uradnem listu (št. [74/21](#)) in je začel veljati 15. maja.**



Foto: Pixabay

Ne glede na to pa rejce perutnine opozarjajo, da so okužbe ptic s tem virusom nepredvidljive in pozivajo, da upoštevajo biovarnostne ukrepe, kot so:

- preprečevanje dostopa prostoživečim pticam (predvsem vodnim) do perutnine,
- preprečevanje dostopa prostoživečim pticam do krme in vode za perutnino,
- omejitve obiskov ljudi v prostorih, kjer je nastanjena perutnina in upoštevanje ukrepov za preprečevanje širjenja bolezni (namestitvev razkuževalnih barier, uporaba zaščitne obleke in obutve, umivanje in razkuževanje rok ...),
- uporaba opreme za enkratno uporabo ali čiščenje in razkuževanje opreme pred uporabo na drugem gospodarstvu s perutnino.

Le tako se lahko učinkovito prepreči vnos povzročiteljev bolezni v reje. Zelo pomembno je tudi zgodnje odkrivanje bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo tudi škode, ki jih pojav bolezni povzroči. Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, je treba biti pozoren

predvsem na:

- zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 20 %),
- padec nesnosti (za več kot 5 %, ki traja že več kot dva dni),
- povišan pogin (v enem tednu za več kot 3 % oziroma v enem dnevu za več kot 1 %),
- kakršne koli klinične znake ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

V primeru naštetih znakov naj rejci perutnine nemudoma pokličejo svojega veterinarja. Več informacij o bolezni [TUKAJ](#).